

ASULOX 40[®]

HERBICIDA



ASULAM

Herbicida de aplicación post emergente, sistémico y selectivo a caña de azúcar.

CONTROL SIN COMPETENCIA

✓ El primer síntoma de acción es la parálisis de crecimiento de las malezas atacadas.

✓ Herbicida sistémico, actúa como inhibidor de la división celular.

✓ Dirigido a control de gramíneas anuales y perennes.

 Cultivo

 Malezas

 Dosis

CAÑA DE AZÚCAR



Arvenses *Digitaria SP*
Abrojo *Tribulus terrestris*
Arrocillo *Echinochloa colonum*
Barba de indio *Echinochloa cruz-galli*
Paja mojada *Leptochloa filiformis*
Caminadora *Rottboelia exaltata*
Cadillo *Cenchrus echinatus*
Pata de gallina *Eleusine indica*
Cola de Zorro *Setaria geniculata*
Gamalote *Paspalum virgatum*
Sorgo *Sorghum halapense*
Grama bermuda *Cynodon dactylon*
Pará *Panicum fasciculatum*
Pata de gallo *Digitaria sanguinalis*
Mejorana *Ageratum conyzoides*
Siempre viva *Commelina elegans*

Dosis post-emergente de 6-7 L/ha
Se recomienda el uso de surfactantes para mejorar la dispersión y penetración en el follaje.



Aplicación

Se recomienda aplicar en los primeros estadios del cultivo.

● Intervalo entre la última aplicación y la cosecha:

La aplicación que se realiza es pre-emergente o pos-emergencia temprana.

● Intervalo de reingreso al área tratada:

24 horas o si es necesario ingresar antes se debe usar equipo de protección.

