

Madurante no herbicida rico en nutrientes esenciales y etileno (5 %).

AZÚCAR Y REBROTOS

PODEROSOS

✓ Estimula la acumulación de sacarosa en el tallo, logrando más azúcar por tonelada de caña.

✓ Impulsa el desarrollo de brotes fuertes y saludables, asegurando un mejor rendimiento en el próximo ciclo.

✓ Evita efectos negativos sobre la planta, actuando de forma natural para garantizar resultados confiables.

Cultivos

Dosis

Época de aplicación

CAÑA DE AZÚCAR



3-5 L/ha (2,1-3,5 L/ha)
Agua: 600L/ha (420 L/ha)

Se recomienda realizar la aplicación de 8-12 semanas antes de la cosecha.

BERENJENA
TOMATE
PAPA
CHILE



3-5 L/ha (2,1-3,5 L/ha)
Agua: 520 L/ha (364 L/ha)

Aplique cuando el 80% de los frutos tengan tamaño comercial para inducir la precocidad, reducir el número de cortes y acelerar la producción. Utilice un volumen suficiente de agua para lograr un buen cubrimiento de los frutos y el follaje.

PIÑA



3-4 L/ha (2,1-2,8 L/ha)
Agua: 1000-2000 L/ha
(700-1400 L/ha)

Aplique para la maduración de frutos y mejorar el contenido de grados Brix, cuando la base de los mismos este de color amarillo.

VID



1-5 L/ha (0,7-3,5 L/ha)
Agua: 880-920 L/ha (616-644 L/ha)

Aplique para uniformizar la cosecha y acelerar la maduración. Inicie las aplicaciones cuando el 20% de los frutos tengan color comercial. Asegure cobertura uniforme de los frutos.

