

SHUTDOWN® 50 SC

HERBICIDA



Herbicida preemergente a base de sulfentrazona, absorbido por raíces y follaje. Controla malezas de hoja ancha desde la germinación, asegurando un cultivo limpio y libre de competencia.

CULTIVOS LIMPIOS

DESDE EL INICIO

- Actúa desde el suelo controlando las plántulas en germinación, logrando necrosis rápida tras la exposición a la luz y protegiendo en etapas iniciales.
- Mantiene el lote libre de malezas desde el comienzo, favoreciendo un arranque más vigoroso y competitivo para el cultivo.
- Su ingrediente activo elimina eficazmente las malezas, evitando que compitan con el cultivo por luz, agua y nutrientes.

Cultivos

SOYA



CAÑA DE AZÚCAR



LIMÓN



PALMA AFRICANA



Malezas

Arrocillo *Digitaria sanguinalis*
Arrocillo *Echinochloa crus-galli*
Arrocillo *Echinochloa colonum*
Bledo *Amaranthus* spp.
Caminadora *Rottboellia cochinchinensis*
Conde *Synconium podophyllum*
Coyolillo *Cyperus rotundus*
Coyolillo *Cyperus ferax*
Chiquizacillo *Spermacoce laevis*
Chiquizacillo *Spermacoce latifolia*
Churristate *Ipomoea* spp.
Escobilla *Sida* sp.
Flor amarilla *Synedrella nodiflora*
Gramalote *Paspalum fasciculatum*
Guarda Rocio *Digitaria sanguinalis*
Helecho macho *Pteridium* sp.
Hierba buena *Borreria* spp.
Kudzu *Pueraria phaseoloides*
Lechosa *Euphorbia* sp.
Lindernia *Lindernia crustacea*
Lirio acuático *Eleocharis grisea*
Lombrecilla *Peperomia pellusida*
Moriseco *Bidens pilosa*
Oreja de burro *Paspalum virgatum*
Ortiga *Flueurya* spp.
Pata de Gallina *Eleusine indica*
Pelo de chino *Fimbristilis anuua*
Plumilla *Leptochloa* spp.
Siempre viva *Commelina* sp.
Selaginela *Selaginella diffusa*
Sorosí *Momordica charantia*
Ventanilla *Philodendron* sp.
Verdolaga *Portulaca* spp.
Zacate Amargo *Paspalum conjugatum*
Zacate Bermuda *Cynodon dactylon*
Zacate Cabezón *Paspalum paniculatum*
Zacate Guinea *Panicum maximum*
Zacate Honduras *Ixophorus unisetus*
Zacate Johnson *Sorghum halepense*
Euphorbia sp.
Kyllinga brevifolia

Dosis

0,5L/ha a 2 L/ha
(0,35-1,40 L/mz)



Aplicación

Se recomienda una única aplicación.

● Intervalo de aplicación:

Depende del tamaño de la maleza, la cual es bien controlada cuando tiene de 20 a 35 centímetros de altura.

● Intervalo de reingreso al área tratada:

24 horas, si es necesario ingresar antes se debe usar equipo de protección.